

BEVACIZUMAB

Avastin®

Monoklonaler Antikörper

Handelsform	Auflösung / Verdünnung	Verabreichung
<p>Durchstechflaschen z(Lösung) zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 mg/4ml • 400 mg/16ml 	<ul style="list-style-type: none"> • Klare bis leicht opaleszierende, farblose bis hellbraune Flüssigkeit zur i.v.-Infusion • Konzentration der verdünnten Lösung sollte im Bereich 1,4 bis 16,5 mg/ml liegen • Mit 100 bis 250 ml NaCl 0,9% verdünnen • Nur drehen, nicht schütteln, Schaumbildung vermeiden 	<ul style="list-style-type: none"> • i.v.-Infusion: <ul style="list-style-type: none"> – 1. Infusion: Über 90 Min. – 2. Infusion (bei guter Verträglichkeit): Über 60 Min. • Alle weiteren Infusionen (bei guter Verträglichkeit): Über 30 Min. • Darf nicht mit Glukose 5% gelöst oder mit anderen Arzneimitteln gemischt werden • Dosisbereich: 5 bis 15 mg/kgKG alle 2 bis 3 Wochen
Lagerung / Stabilität	Unerwünschte Wirkungen (Stunden bis Tage)	Unerwünschte Wirkungen (Tage bis Wochen)
<p><u>Originalpackung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Kühlschrank • Lichtschutz • Nicht gefrieren lassen, nicht schütteln <p><u>Weiterverdünntes Arzneimittel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sofort verabreichen • 24 Std. bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank 	<ul style="list-style-type: none"> • Infusionsreaktion*; Hypersensitivitätsreaktion bis Anaphylaxie 	<ul style="list-style-type: none"> • Arterielle Thromboembolien • Wundheilungsstörungen, Blutungen: Nasen- oder Zahnfleischblutungen, tumorassoziierte Blutungen, pulmonale Hämorrhagie/Hämoptye • Perforationen GI-Trakt oder Gallenblase • Hypertonie / Hypertensive Krise • Proteinurie • Kopfschmerzen • Knochenmarkstoxizität • Bildung von Fisteln • Gewichtsverlust • Peripherer sensorische Neuropathie • Dysgeusie • Diarrhoe, Obstipation • Exanthem, Xerodermie • Fatigue, Asthenie • Orale Mukositis
Spezifische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Schädigungstyp bei Paravasation: Nicht gewebeschädigend. • Infusionsreaktion*: Weitere Informationen siehe Einleitung. • Monitoring: Urin-Stick, Leber- und Nierenfunktion, Blutdrucküberwachung. • Zur Rückverfolgbarkeit Handelsname und Chargennummer dokumentieren. • Avastin ist für Patienten unter 18 Jahren nicht zugelassen. • Schwangerschaft vermeiden. Frauen im gebärfähigen Alter ist empfohlen eine zuverlässige Verhütungsmethode während und bis 6 Mt. nach der Behandlung anzuwenden. • Bevacizumab hemmt die Wundheilung: Wundheilung muss nach einer Operation vor Avastin-Therapie abgeschlossen sein. Nach Implantation eines Portsystems mind. 2 Wochen mit der zuwarten. 	
<p>Version 2020 Stand Information compendium.ch®: April 2017</p>	<p>BEVACIZUMAB</p>	